Rövid Szuicid Kérdőív

Öngyilkossági gondolat/szándék/terv vagy 3 hónapon belül elkövetett szuicid kísérlet explorálható? Ha „igen", kifejezett, közvetlen szuicid veszély áll fenn, további kitöltés nem szükséges. Ha „nem", folytassa az 1. ponttól.

1. Elsődleges (pszichiátriai) kockázati tényezők:		
A. Jelenlegi vagy korábbi pszichiátriai betegség (major depresszió, bipoláris betegség, szerhasználat, szkizofrénia)	Igen 6	Nem 0
B. Jelenleg fennálló agitáció/inszomnia/reménytelenség	Igen 6	Nem 0
C. Korábbi öngyilkossági kísérlet	Igen 6	Nem 0
D. Öngyilkosság a családi előzményben (1. vagy 2. fokú rokonok)	Igen 4	Nem 0
2. Másodlagos (pszichoszociális) kockázati tényezők:		
A. Akut stresszor/impulzivitás/agresszivitás	Igen 4	Nem 0
3. Harmadlagos (demográfiai) kockázati tényezők:		
A. Férfi/idős kor	Igen 2	Nem 0
1+2+3 összesen:	.....	

Hivatkozások

Bolton, J. M., Gunnell, D., & Turecki, G. (2015). Suicide risk assessment and intervention in people with mental illness. *BMJ, 351*, h4978. doi:10.1136/bmj.h4978

Carter, G., Milner, A., McGill, K., Pirkis, J., Kapur, N., & Spittal,

Hawgood, J. L., & De Leo, D. (2016). Reconceptualising suicide risk assessment: A person-centred approach to needs-based exploration of current suicidality. *InPsych, 38*(1), 10–11.

Központi Statisztikai Hivatal (KSH) (2019). *Halálozások a gyakoribb halálokok szerint (1990-)*. Elérés: http://www.